



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A

ESQUEMA DE VACUNACION BASICO Y COMPLEMENTARIO



ESQUEMA	VACUNA	ENFERMEDAD PROTEGE	EDAD –DOSIS- REFUERZOS DE APLICACION	DONDE SE APLICA	RECOMENDACIONES GENERALES	REACCIONES POST-VACUNALES	MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS	
ESQUEMA BASICO DE VACUNACION	BCG	Meningitis Tuberculosa	Recién Nacido –Dosis única	Región supra escapular izquierda	Peso Superior a 2000 gramos. Edad Máxima 11 Meses y 29 Días En hijos de mujeres con VIH debe retrasarse la aplicación hasta que se descarte infección en el menor.	Cicatriz-Pequeña Ampolla en sitio aplicación.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.	
	HEPATITIS B	Hepatitis B	Recién nacido	Muslo	Peso Superior a 2000 gramos. Primeras 12 Horas de Vida.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.		
	POLIO ORAL	Poliomielitis	4 y 6 meses, Refuerzo 18 Meses y 5 Años	Oral	Contraindicada en Hijos de Mujeres con VIH.	Síntomas gastrointestinales y fiebre.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.	
	POLIO INYECTABLE	Poliomielitis	2 meses esquema PAI.	Muslo		Indicada para Niños con inmunosupresión comprobada o en estudio.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
			2, 4, y 6 meses, Refuerzo 18 Meses y 5 Años	Muslo - Brazo parte superior en caminadores				
PENTAVALENTE	Difteria, Tétano, Tos Ferina, Hepatitis B, Meningitis y otras enfermedades	2, 4 y 6 Meses	Muslo	Indicada la aplicación simultánea con polio.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.		



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A ESQUEMA DE VACUNACION BASICO Y COMPLEMENTARIO



		causadas por Haemophilus Influenzae tipo B					
	ROTAVIRUS	Diarreas (gastroenteritis) Causadas por Rotavirus	2 y 4 Meses	Oral	Edades Máximas de Aplicación 1era Dosis: 3 meses y 21 Días 2da Dosis: 11 Meses y 29 días	Fiebre, Pérdida de Apetito, Gases, Vomito-Diarrea, irritabilidad.	Rehidratación y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	NEUMOCOCO 10 o 13 Valente	Neumonía, otitis media aguda, meningitis, bacteremia y sepsis.	2, 4 Meses y refuerzo al año.	Muslo – Brazo parte Superior en Caminadores		Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	TRIPLE VIRAL	Sarampión, Rubeola y Paperas.	Al año y a los 5 años	Brazo parte superior	Refuerzo adicional a partir de los 10 años.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	FIEBRE AMARILLA	Fiebre Amarilla	Dosis única a los 18 meses	Brazo parte superior	Edad máxima de aplicación 60 años.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	HEPATITIS A NIÑOS X80MCG	Hepatitis A	Al año- Refuerzo a los 6 Meses de la primera Dosis	Brazo parte superior	Edad máxima de aplicación 16 años	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	DPT (DIFTERIA TÉTANO Y TOS FERINA)	Difteria, Tétano y Tos Ferina.	Refuerzo a los 18 meses y 5 años	Brazo parte superior	Edad Máxima de aplicación: 5 Años 11 meses y 29 días. Mínimo intervalo entre el 1 ^{er} y 2 ^{do} refuerzo: 12 meses.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A

ESQUEMA DE VACUNACION BASICO Y COMPLEMENTARIO



	VARICELA	Varicela	Al año. Refuerzo a los 3 meses de la primera dosis.	Brazo parte superior	A partir del año 2 dosis intervalo de 3 -6 meses.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	TOXOIDE TETÁNICO/ DIFTÉRICO	Tétanos, Difteria	Una dosis inicial. 2ª dosis al mes de la 1ª. 3ª dosis a los 6 meses de la 2ª. 4ª dosis al año de la 3ª. 5ª dosis al año de la 4ª. Un refuerzo cada 10 años después de la 5ª dosis.	Brazo parte superior	Indicada a partir de los 7 años. Mujeres en edad fértil 10 – 49 años. Gestantes.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	DPT (ACELULAR) -GESTANTES	Difteria Tétano y Tos Ferina	Única dosis a partir de las 26 Semanas de gestación.	Brazo parte superior	Aplicar una dosis durante cada gestación.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
VACUNACION COMPLEMENTARI A	NEUMOCOCO (23 Valente) ADULTO	Neumonía, otitis y meningitis asociadas a infección por Streptococo pneumoniae.	Desde los 2 años de edad y refuerzo cada 5 años en condiciones especiales.	Brazo parte superior	Indicada en mayores de 55 años, personas esplenectomizadas, con inmunosupresión o con antecedente de neumonía por neumococo.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	VARICELA	Varicela	Al año. Refuerzo a los 3 meses de la primera dosis.	Brazo parte superior	A partir del año 2 dosis intervalo de 3-6 meses.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A ESQUEMA DE VACUNACION BASICO Y COMPLEMENTARIO



	HEPATITIS A – 160 MCG ADULTO	Hepatitis A	Desde los 16 años; Refuerzo a los 6 meses de la primera dosis.	Brazo parte superior	Edad máxima 65 años	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	HEPATITIS B	Hepatitis B	3 Dosis Intervalo de la 1era y la 2da de un Mes y la 3ra Dosis A los 6 meses de la 1era.	Brazo parte superior	Cualquier Edad	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	HEXAVALENTE	Difteria, Tétano, Tos Ferina, Hepatitis B, Meningitis por Hemophilus Influenza + VIP	2 ,4, 6 Meses	Muslo		Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	DPT (ACELULAR)	Difteria Tétano y Tos Ferina)	A partir de los 11 años Mujeres en embarazo con 21 semanas gestación.	Brazo parte superior	Edad Máxima 65 AÑOS.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	DPT NIÑOS- ACELULAR	Difteria Tétano y Tos Ferina)	1era Dosis 18 Meses y 5 Años	Brazo parte superior	Edad Máxima 6 Años-	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	INFLUENZA	Virus de la Influenza	1era Dosis 6Meses - 2da 7Meses Ref. Cada Año	Brazo parte superior/ Perna en Niños No caminadores	Según Criterio Medico	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	MENINGOCOCO	Enfermedad	De los 9 a los 23 meses,	Brazo parte	Edad Máxima 56 años.	Reacción Local: Dolor,	Medios físicos y recomendaciones de



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A ESQUEMA DE VACUNACION BASICO Y COMPLEMENTARIO



		Meningitis meningocócica	1 dosis y refuerzo a los 3 meses. Mayor de 2 años, dosis única.	superior/ Perna en Niños No caminadores		tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	VIRUS PAPILOMA HUMANO	Virus del Papiloma Humano	9 años hasta 45 años Esquema 0-2-6 Meses	Brazo Superior	Edad Máxima 45 años.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	VARICELA + TRIPLE VIRAL	Varicela+ Sarampión, Rubeola y parotiditis	9-12 años dos dosis con intervalo de seis semanas	Brazo	Puede Variar 1-2 dosis según historial vacuna.	Puede presentar síncope (desfallecimiento), fiebre, parestesia y movimientos tónicos clónicos en los miembros.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	HEPATITIS A+ HEPATITIS B	Hepatitis A+ Hepatitis B	A partir de 1 año de edad tres Dos (0-1- 6 meses)	Brazo/Muslo	No se recomienda para profilaxis post-exposición	Puede presentar síncope (desfallecimiento), Déficit Visual transitorio, parestesia y movimientos tónicos clónicos en los miembros.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	HERPES ZOSTER	Herpes Zoster	Dosis única. A partir de los 50 años o más edad.	Brazo superior	Contraindicada en personas con inmunosupresión comprobada o en estudio; personas con antecedente de alergia a la neomicina y mujeres en embarazo	Hinchazón, prurito (picazón) Reacción Local (Dolor, tumefacción, Enrojecimiento Sitio Aplicación) , Fiebre,	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.



CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CDI S.A ESQUEMA DE VACUNACION BASICO Y COMPLEMENTARIO



	TOXOIDE TETÁNICO	Toxoide Tetánico	3 Dosis Intervalo de la 1era y la 2da de un Mes y la 3ra Dosis A los 6 meses de la 1era.	Brazo parte superior	Verificar antecedente Vacunal.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	PREVENAR 13 (Proteína CRM 197)	Neumococo (Meningitis, Neumonía, Bacteremia y Otitis)	Esquema en lactantes: 2-4-6 meses Refuerzo 11 a 12 meses 2 años-17 años: 1 dosis 50 años en adelante: 1 dosis	Menor 1 año Muslo Brazo parte superior	Contraindicada en mujeres embarazadas	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.
	FIEBRE TIFOIDEA	Fiebre tifoidea por Salmonella Typhi.	Dosis única a mayores de 2 años.	Brazo parte superior	Administrarse al menos dos semanas antes de la posible exposición.	Reacción Local: Dolor, tumefacción, enrojecimiento sitio aplicación, fiebre y llanto persistente.	Medios físicos y recomendaciones de manejo terapéutico según pediatra y/o médico tratante.